

Во время движения водитель внезапно начинает жаловаться на сильную давящую боль в грудной клетке и затруднённое дыхание. Как надо поступить?

1. Предложить ему обратиться в ближайшую больницу.
2. Дать ему 2 таблетки валерианы и стакан воды.
3. Предложить незамедлительно остановить транспортное средство и включить аварийную сигнализацию.
4. Посоветовать ему пройтись и подышать свежим воздухом.

Отв. ` 3

Как надо оказывать помощь пострадавшему при судорожном припадке?

1. Удерживать пострадавшего, стараясь ослабить судороги.
2. Попытаться раскрыть рот и удерживая язык, вложить какой-нибудь предмет между зубов.
3. Попытаться освободить дыхательные пути, приподняв голову пострадавшего.
4. Не дотрагиваться до пострадавшего, подождать пока судороги не прекратятся.

Отв. ` 4

Как надо поступить оказывая помощь при ожогах?

1. Оставить место ожога открытым.
2. Вскрыть волдыри с жидкостью, после чего туго перевязать.
3. Смазать место ожога растительным маслом.
4. Охладить место ожога водой, после чего накрыть стерильной перевязочной материей или чистой тканью

Отв. ` 4

Попав в аварию, пешеход сломал руку. На предплечье имеется рана (около 5 см), из которой непрерывно вытекает кровь темного цвета. Что надо предпринять для остановки кровотечения?

1. Промыть рану водой.
2. Приподнять руку пострадавшего и наложить тугую повязку.
3. Рану смазать спиртовым раствором йода.

Отв. ` 2

Оказывая помощь при закрытых травмах мягких тканей конечностей, в первую очередь следует:

1. Наложить на рану тёплую примочку.
2. Наложить на рану холодную примочку и приподнять.
3. Наложить на рану холодную примочку и удерживать конечность ниже уровня сердца.
4. Наложить на рану спиртовую примочку.

Отв. ` 2

Водитель продолжительное время, сидя на корточках, заменял колесо автомобиля . Резко привстав, хватается за голову и потеряв сознание, падает. Как следует поступить?

1. Попытаться посадить его.
2. Приподнять ноги.
3. Обрызгать лицо холодной водой.
4. Дать пощечину.

Отв. ` 2

Как следует поступить, если невозможно обеспечить безопасность на месте происшествия?

1. Соблюдая осторожность, оказать помощь всем пострадавшим.
2. Оказать помощь пострадавшему, находящемуся к Вам ближе всех.
3. Не подходить, немедленно сообщить о случившемся и не разрешать так же посторонним лицам подходить к месту происшествия.
4. Не подходить к месту происшествия, попросить других лиц оказать помощь пострадавшим.

Отв. ` 3

Вы увидели лежащего на земле человека и заметили кровь и кость, торчащую из голени. Что надо предпринять в первую очередь?

1. Вызвать скорую помощь.
2. Проверить находится ли пострадавший в сознании и наличие дыхания.
3. Обездвижить ногу.

Отв. ` 2

Оказывая помощь пострадавшему при открытом переломе конечности, необходимо:

1. Немедленно приподнять травмированную конечность пострадавшего.
2. Накрыть рану стерильной салфеткой и обездвижить травмированную конечность.
3. Надавив, остановить кровотечение.
4. Наложить на рану холодную примочку.

Отв. ` 2

При травме грудной клетки необходимо:

1. Уложить пострадавшего в горизонтальном положении.
2. Посадить, подперев его с травмированной стороны.
3. Посадить, подперев его со здоровой стороны.

Отв. ` 2

Оказывая помощь пострадавшему при травме головы, необходимо:

1. Уложить, приподняв ноги.
2. Уложить, приподнять голову и туловище, обеспечив полулежащее положение.
3. Уложить в горизонтальном положении.

Отв. ` 2

Кому из перечисленных пострадавших в дорожно-транспортном происшествии окажете первую помощь?

1. Испуганной беременной женщине.
2. Ребенку, имеющему царапины.
3. Мужчине с переломом плеча.
4. Мужчине, находящемуся в безсознательном состоянии.

Отв. ` 4

Оказывая помощь пострадавшему при кровотечении из носа, необходимо:

1. Приподнять голову пострадавшего.
2. Голову опустить и прижать верхнюю часть носа.
3. Вложить ватный тампон в нос пострадавшего.
4. Дождаться прекращения кровотечения.

Отв. 2

При выпадении внутренних органов вследствие травмы брюшной полости необходимо:

1. Промыть и попытаться осторожно вложить их обратно.
2. Накрыть выпавшие органы чистой влажной тканью и полиэтиленовой пленкой.
3. Перезакрыть выпавшие органы и перевязать рану.
4. Не дотрагиваться, и в этом состоянии перевезти пострадавшего в больницу.

Отв. 2

При наличии дыхания у находящегося в безсознательном состоянии пострадавшего необходимо:

1. Уложить его на спину.
2. Открыть рот и вытянуть язык.
3. Повернуть на бок и приподнять голову.

Отв. 3

При сильном кровотечении необходимо:

1. Перевязать рану.
2. Наложить тугую повязку, надавив на точку сдавливания артерии.
3. Посыпать рану пеплом.

Отв. 2

При дорожно-транспортном происшествии в первую очередь необходимо:

1. Уложить пострадавшего в удобном положении.
2. Обследовать место происшествия, обеспечив безопасность.
3. Проверить наличие сильного кровотечения у пострадавшего.
4. Вынести пострадавшего из автомобиля.

Отв. 2

Если в ране пострадавшего находится инородный предмет, то при оказании помощи, необходимо:

1. Достать из раны инородный предмет.
2. Не препятствовать кровотечению.
3. Зафиксировать инородный предмет в неподвижном положении.
4. Область раны обработать спиртом.

Отв. 3

Пульс у взрослого человека в состоянии покоя составляет:

1. 40-60 ударов в минуту.
2. 60-80 ударов в минуту.
3. 80-100 ударов в минуту.

Отв.` 2

Частота дыхания у взрослого человека в состоянии покоя составляет:

1. 12-18 дыхательных движений в минуту.
2. 20-30 дыхательных движений в минуту.
3. 40-60 дыхательных движений в минуту.

Отв.` 1

Пострадавшего в аварии следует вынести из автомобиля, если:

1. У пострадавшего наблюдаются серьезные травмы.
2. Место происшествия небезопасно, например возможен взрыв.
3. На автомобиль упал электрический провод.

Отв.` 2

Оказывая помощь пострадавшему, при подозрении внутреннего кровоизлияния в брюшной полости, необходимо:

1. Уложить пострадавшего и наложить холодную примочку.
2. Положить на живот горячую грелку.
3. Наложить на брюшную полость тугую повязку.
4. Пострадавшему дать обильное питье.

Отв.` 1

Из соседнего автогаража доносится звук работающего двигателя . Открыв дверь, вы видите лежащего на полу соседа. Что следует предпринять в первую очередь?

1. Распахнуть двери автогаража, выключить двигатель и, если возможно, вынести пострадавшего с места происшествия.
2. С целью обнаружения травм тщательно обследовать пострадавшего.
3. Уложить пострадавшего на бок, в удобном положении.
4. Помочь пострадавшему принять положение полусидя.

Отв.` 1

При обнаружении пострадавшего в безсознательном состоянии в первую очередь необходимо:

1. Напоить его холодной водой.
2. Уложить пострадавшего на бок, в удобном положении.
3. Обеспечить нормальную температуру тела.
4. Освободить дыхательные пути и проверить дыхание.

Отв.` 4

Для проверки кровообращения в конечностях пострадавшего Вы надавливаете и отпускаете ноготь на пальце травмированной конечности и приходите к выводу, что кровообращение нарушено, так как :

1. Пострадавший чувствует боль.
2. Пострадавшего что-то беспокоит.
3. Место нажатия под ногтем белеет с трудом.
4. Цвет на надавленном месте с трудом возвращается в прежний розовый.

Отв.` 4

Ваш приятель, больной сахарным диабетом, чувствует недомогание и к тому же не помнит когда ему в последний раз вводили инсулин. Что надо предпринять в первую очередь?

1. Дать пострадавшему сахар или сладкое питье.
2. Предложить ему отдохнуть несколько часов.
3. Посоветовать сделать инъекцию инсулина.

Отв.` 1

Кровотечение считается наиболее опасным, если:

1. Кровь свертывается в течение 10 минут.
2. Кровь бьёт из раны струёй.
3. Кровь тёмно-красного цвета.
4. Кровь из раны вытекает непрерывно.

Отв.` 2

После наезда автомобиля на столб оборвавшийся электрический провод лежит на находящемся без сознания пострадавшем. При оказании помощи, в первую очередь следует:

1. Оттащить пострадавшего от источника тока.
2. Провести первичное обследование.
3. С помощью какого-либо изолирующего предмета удалить провод с пострадавшего.
4. Найти места входа и выхода электрического тока (места ожога) на теле пострадавшего.

Отв.` 3

Чтобы обезопасить себя от заражения при оказании первой помощи следует:

1. Постараться избежать прямого контакта с раной и помощь оказывать только в стерильных перчатках.
2. Не оказывать помощь тем пострадавшим, у которых наблюдается сильное кровотечение.

Отв.` 1

В случае приступа бронхиальной астмы у пострадавшего следует:

1. Помочь ему принять положение полусидя.
2. Уложить и приподнять ноги.
3. Уложить и согнуть ноги в коленных суставах.
4. Уложить и приподнять голову.

Отв.` 1

Пострадавшего с травмой брюшной полости следует:

1. Уложить и приподнять голову.
2. Уложить и приподнять ноги.
3. Уложить и согнуть ноги в коленных суставах.

Отв.` 3

Если пострадавший находится в безсознательном состоянии, следует:

1. Обеспечить пострадавшему положение полусидя.
2. Уложить и приподнять ноги.
3. Уложить и согнуть ноги в коленных суставах.
4. Уложить и приподнять голову.

Отв.` 2

При наезде автомобилем с низким кузовом на пешехода, имеющего рост 155 см. или более, наиболее возможно травмирование:

1. Нижних конечностей и головы .
2. Таза и грудной клетки.

Отв.` 1

При наезде автомобилем с низким кузовом на 3-5 летнего ребёнка наиболее возможно травмирование:

1. Нижних конечностей и головы.
2. Таза и грудной клетки.

Отв.` 2

Если электрический провод лежит на автомобиле, необходимо:

1. Помочь находящимся в нём людям срочно покинуть автомобиль.
2. Попросить находящихся в нем людей не выходить из автомобиля, пока не будет выключен электрический ток.

Отв.` 2

При обработке не очень опасных ран следует:

1. Промыть рану чистой водой с мылом, после чего перевязать.
2. Обработать рану каким-нибудь веществом на спиртовой основе (йод, водка и т.д ).

Отв.` 1

При обработке опасных ран следует:

1. Промыть рану чистой водой с мылом.
2. Обработать рану каким-нибудь веществом на спиртовой основе (йод, водка и т.д )
3. Остановить кровотечение и перевязать рану.

Отв. 3